

6^{ième} année de mesure de l'herbe dans le
cadre du Plan Bio de l'Avesnois

6 sites mesurés en Avesnois


Fermes en bovins lait et en bovins viande

1 mesure par semaine à compter du 14 mars

Point météo

Pluviométrie

	Pluviométrie 01 janvier-14 avril	
	2024	2025
Ohain	392 mm	235 mm
Flaumont-Waudrechies	312 mm	234 mm
Bousies	380 mm	220 mm
Sivry-Rance	351 mm	224 mm
Sivry-Rance (moyenne 2019-2024)	291 mm	



Le début de l'année est marqué par une faible pluviométrie totale bien que le mois janvier ait été très humide. Il représente à lui seul 75 % de la pluviométrie jusqu'à présent.

Malgré le « trop d'eau » de début 2025 a vite été balayé par les vents

asséchants et le manque de pluviométrie du mois de mars (en moyenne 7 mm en mars sur l'Avesnois, contre 47 mm sur la moyenne 2019-2024 à Sivry-Rance).

Sommes des températures



Les sommes des températures affichent un retard de 13 jours par rapport à 2024. En effet, bien que depuis mi-mars les températures en journées soient clémentes, les gelées nocturnes perdurent jusque mi-avril et impactent fortement les sommes de températures.

Sommes températures	2024	2025	Moyenne 2019-2024
1er février			
1er mars	214	116	171
14 avril	631	499	511

Quelques repères sur la correspondance entre somme des températures et gestion de l'herbe :

en °C jour	Stade des plantes				
	Départ en végétation	Epi à 5 cm	Début épiaison	Pleine épiaison	Pleine floraison
	Pratiques de gestion de l'herbe				
Type de prairie	Mise à l'herbe	Fin déprimage/ 1 ^{er} tour	Ensilage Enrubanné	Foin précococ	Foin tardif
Prairies temporaires fertiles et précoces	250	500	800	1 000	1 200
Prairies permanentes fertiles et précoces	300	500	900	1 100	1 300
Prairies permanentes de fertilité moyenne	400	800	1 000	1 400	1 600
Prairies permanentes peu fertiles	500	1 000	-	-	-


Niveau des nappes



Si les cartes du BRGM indiquaient un niveau haut en janvier 2025, les conséquences du manque d'eau sont déjà visibles sur les nappes phréatiques. Notamment dans l'Avesnois où le niveau des nappes est **en baisse** avec une situation « **autour de la moyenne** » en avril 2025.

En comparaison, la situation au premier avril 2024 était bien plus favorable qu'aujourd'hui et cela s'est traduit par une pousse de l'herbe constante l'année dernière. La pluviométrie à venir jouera un rôle important sur les nappes et la pousse de l'herbe.

Pousse de l'herbe 2025



Les conditions d'ensoleillement et la portance du sol ont été favorables à la sortie des animaux dès début mars.

Pour autant, les gelées et le manque d'eau n'ont pas permis de refaire un stock d'herbe sur pied après le premier tour. Les sorties trop précoces (avant le 1^{er} avril) entraînent aujourd'hui « une course à l'herbe ». Ce sont les stocks de fourrages conservés qui assurent la longue transition. Malgré cela, l'envie des animaux à sortir en prairie provoque un refus des fourrages sur la table d'alimentation. L'ingestion totale journalière s'en trouvant diminuée, nous n'observons pas d'augmentation (voir une diminution) de la production laitière en ce début de printemps.

Il est encore d'agir pour que cette période ne nuise pas à toute la saison de pâturage :

- Ne pas entamer le deuxième tour si les stocks disponibles sur pied sont inférieurs à 15 jours
- Ne pas refaire entrer les animaux sur une parcelle dont l'herbe est inférieure à 12 cm (surpâturage, sol-nu, nanification des graminées)
- Si nécessaire, sortir les animaux sur une parcelle parking avec une complémentation à l'auge ou au râtelier

« Beau temps à la Saint-Anicet (17 avril) est
l'annonce d'un bel été »

